



Krakow-Lublin Ophthalmology Summit

5th Krakow-Lublin Ophthalmology Summit
2-3.12.2022 – LUBLIN

Ostra polimorficzna wysiękowa makulopatia żółtkowata – 4 lata obserwacji chorego. Acute Exudative Polymorphous Vitelliform Maculopathy – 4 years of patient follow up .

dr hab. n. med. Anna Matysik-Woźniak, dr n. med. Maksymilian Onyszkiewicz, dr hab. n. med. Tomasz Chorągiewicz , dr n. med. Dominika Nowakowska, dr n. med. Małgorzata Latańska, prof. dr hab. n. med. Robert Rejda

Katedra i Klinika Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej UM w Lublinie

Ostra polimorficzna wysiękowa makulopatia żółtkowata (Acute Exudative Polymorphous Vitelliform Maculopathy) została opisana po raz pierwszy przez Gassa i wsp. w 1988 roku. AEPVM to rzadkie, obustronne schorzenie płamki o nieznannej etiologii, wykazujące różnorodne objawy kliniczne. Charakteryzuje się wielogniskowymi okrągłymi lub półksiężycowatymi żółtymi złogami podsiatkówkowymi, których wygląd może się zmieniać w czasie trwania choroby. AEPVM był opisywany jako cecha zespołu paraneoplastycznego w połączeniu z różnymi typami czerniaka i raka. Opisywano go również w przebiegu chorób zakaźnych ub jako proces idiopatyczny. Prawdziwy mechanizm tej choroby nie jest do końca poznany

W pracy przedstawiono chorego z AEPVM, w ciągu 4 lat obserwacji. Pacjent był monitorowany przy pomocy diagnostyki multimodalnej, która wykazała ewolucję i stopniową resorpcję zmian podsiatkówkowych. Ostrość wzroku nie pogorszyła się istotnie w trakcie obserwacji. Nie stwierdzono schorzeń ogólnoustrojowych, które mogłyby wpływać na powstanie opisywanych zaburzeń.

Wnioski: AEPVM wymaga różnicowania m.in. ze zwyrodnieniem płamki związanym z wiekiem czy dystrofiami.. Ze względu na możliwe powiązania z chorobami ogólnoustrojowymi, wymaga także diagnostyki internistycznej chorego.

Biuro Organizatora: **InspireCongress Sp. z o.o.**

ul. Powstańców Śl. 95, 53-332 Wrocław

biuro@inspirecongress.pl

tel.: +48 (71) 780 90 52

